

品悅牙醫骨釘裝置注意事項

矯正治療中，因治療的需要，已在您的口內放置了骨釘裝置，請依照下列注意事項來配合維護您口內的骨釘，已達到良好的治療效果：

1. 裝置骨釘時，已在您的口內施予微量的麻藥，建議麻藥退後才能進食或飲用熱品，以避免咬傷、燙傷嘴唇。
2. 麻藥退後，骨釘位置會有微微的痠痛感，屬正常現象。
3. 建議裝置完骨釘的第一天按時服用消炎及止痛藥，第二天後若無疼痛感可自行停止服用止痛藥，但消炎藥三天份請按時服用完畢。
4. 裝置骨釘的位置請務必依照下列方式清潔：



A. 以棉花棒沾取漱口水後，以環形旋轉的方式擦拭骨釘的周圍及骨釘頭。

B. 清潔時機為三餐飯後及睡前，需將骨釘周圍徹底清潔乾淨。

C. 請勿用牙刷清潔骨釘周圍，以避免周圍軟組織受傷。

若無徹底清潔骨釘，會增加骨釘鬆脫的可能，也會影響矯正療程進度與計畫。

5. 骨釘放置處有可能會與臉頰或唇側邊磨擦，造成不適或口瘡，建議可使用軟蠟將骨釘包覆住，以減少磨擦。清潔口腔時將軟蠟取出，清潔後請更換新的軟蠟。
6. 骨釘裝置處，若有異常紅腫熱痛，請立即回診！！

品悅牙醫診所關心您!!!

品悅牙醫骨釘治療之注意事項之交付回條

本人/及家長已閱讀完上述骨釘之注意事項，且充分了解其中內容，並願意配合治療。

本人/家長簽名：_____ 病歷號碼：_____

